

*Cyartonema* COBB 1920

Diagnose der Gattung *Cyartonema* COBB 1920, syn. *Southernia* ALLGÉN 1929: Cuticula glatt oder fein geringelt mit Körperborsten zumindestens im Schwanzbereich; Kopf abgerundet und abgesetzt; 4 Kopfborsten vorhanden; Seitenorgan groß, kreisrund oder oval mit verdicktem Rand; Mundhöhle fehlt; Oesophagus dreiteilig: der vordere Teil muskulös, dann verdünnt und drüsig; Bulbus kaum erkennbar, anscheinend muskelarm; Exkretionsporus hinter dem Nervenring, nahe dem Vorderende des Bulbus; Spicula gebogen, Gubernaculum vorhanden und mit auffälliger Dorsalapophyse.

Zu *Cyartonema* gehören: *Cyartonema flexile* COBB 1920; *Cyartonema zosterae* (ALLGÉN 1929) comb. n., syn. *Southernia zosterae* ALLGÉN 1929, syn. *Southernia rubra* SCHULZ 1932; *Cyartonema tenuicauda* (ALLGÉN 1933) comb. n., syn. *Southernia tenuicauda* ALLGÉN 1933; *Cyartonema germanicum* sp. n. Möglicherweise gehört hierher *Southernia roervikensis* ALLGÉN 1946, die schon von Wieser (1956) als "species inquirenda" bezeichnet wurde, sowie *Paraterschellingia brevicaudata* (KREIS 1924) und *Paraterschellingia fusiformis* GERLACH 1951. *Southernia elongata* STEKHOVEN 1950 ist nach VITIELLO (1971) zu *Siphonolaimus* DE MAN 1893 zu stellen. *Southernia siphonolaimoides* WIESER 1956 wurde von GERLACH (1963b) mit Vorbehalt zur Gattung *Terschellingia* gestellt.