

*Desmodora campbelli* n. sp.

(Fig. 19.)

♂ L. = 0,960 mm,  $\alpha = 20$ ,  $\beta = 6,4$ ,  $\gamma = 10,7$ .

♀ L. = 0,985 mm,  $\alpha = 17,3$ ,  $\beta = 7,3$ ,  $\gamma = 10,9$ .

Körper beim ♀ in seiner ganzen Länge etwa gleichdick, beim ♂ in der hinteren Hälfte wesentlich dicker als in der vorderen. Haut relativ dick, an der Dorsal- und Ventralseite des Kopfes in der Seitenorganregion zudem stark verdickt, außer am Kopf und an der Schwanzspitze geringelt und mit zahlreichen kurzen, submedian gestellten Borsten versehen, deren Länge etwa  $\frac{1}{6}$  der Körperbreite ausmacht. Das Vorderende des Kopfes ist abgerundet und schmaler als der übrige Teil des Kopfes, von dem es auch deutlich abgegrenzt wird.

Kopfborsten submedian gestellt. Seitenorgane nahe dem Vorder- rand gelegen, spiralig, aber nur eine Windung beschreibend, groß, etwa  $\frac{1}{3}$  des betreffenden Kopfdurchmessers ausmachend. Ösophagus schmal, etwa gleichdick, mit Bulbus. Schwanz kurz, mit spitzem,

triangulärem Endzapfen versehen. Am Beginn des hinteren Drittels seiner Länge zeigt die Haut in der ventralen Medianlinie beim ♂ eine kleine, warzenförmige Erhebung. Spicula schlank, kräftig gebogen. Akzessorisches Stück kaum von halber Spiculumlänge, dorsad gerichtet. 6 präanale, halbmondförmige Papillen.

Fundort. Campbell-Insel, Persev. Harbour, in der Strandregion.




Fig. 19.

*Desmodora campbelli* n. sp.

a Kopf.

b Schwanz.