

11. *Microlaimus problematicus* ALLGÉN 1932.

$L = 0,538$ mm; $a = 22,4$; $b = 6,3$; $c = 7,17$; $V = 47,1$ %.

Körper nach vorn auf $\frac{1}{3}$ der Breite am Hinterende des Ösophagus oder $\frac{1}{5}$ der Breite an der Vulva verjüngt. Haut geringelt. Kopf mit 4 kurzen Kopfborsten. Seitenorgane klein, nehmen $\frac{2}{5}$ der entsprechenden Körperbreite ein und liegen 15μ hinter dem Vorderende des Körpers. Mundhöhle schmal, mit kleinem Dorsalzahn. Ösophagus mit mäßig großem Bulbus. Exkretionsporus nur 12μ vom Vorderende des Körpers entfernt, also noch vor den Seitenorganen. Schwanz zylindrokonisch, am Ende abgerundet, nach der Zeichnung mehr als 5 Analbreiten lang.

Campbellinsel, Perseverance Harbour, unter Rotalgen aus 40 m Tiefe, 1 ♀.

DE CONINCK & SCHUURMANS STEKHOVEN 1933 betrachten diese Art als eine „doubtful species“. Doch scheint die Art wirklich zur Gattung *Microlaimus* zu gehören, und trotz der knappen Beschreibung läßt sich *M. problematicus* durch Größe, Lage des Exkretionsporus und Gestalt des Schwanzes von den anderen Arten unterscheiden.