

Neochromadora (Neochromadora) brevisetosa Wieser, 1954

(fig. 4 h-i)

Nº Ejemplares: 62 ♂, 70 ♀, 6 juv.

Referencias: WIESER, 1954 (p. 198-199, fig. 18 a-c)

♂ L = 1,53 mm; a = 27,6; b = 7,14; c = 11,95

Diámetro cefálico: 0,016; sedas cefálicas: 0,003; distancia ocelos-extremo anterior: 0,017; long. esófago: 0,214; máxima anchura bulbo esofágico: 0,016; diámetro máximo: 0,05; long. espícula: 0,047; long. gubernaculum: 0,026; long. cola: 0,128; diámetro anal: 0,044; (en mm).

♀ L = 1,47 mm; a = 24,87; b = 6,62; c = 6,86; V = 55,57%

Diámetro cefálico: 0,016; sedas cefálicas: 0,003; distancia poro excretor-extremo anterior: 0,035; distancia anillo nervioso-extremo anterior: 0,106; distancia ocelos-extremo anterior: 0,017; long. esófago: 0,229; bulbo esofágico (long. x anchura): 0,07 x 0,022; diámetro máximo: 0,059; distancia vulva-extremo anterior: 0,81; long. cola: 0,215; diámetro anal: 0,029; (en mm).


juv. L = 1,23 mm; a = 24,6; b = 5,74; c = 6,37

Diámetro cefálico: 0,014; sedas cefálicas: 0,0022; distancia poro excretor-extremo anterior: 0,032; distancia anillo nervioso-extremo anterior: 0,099; long. esófago: 0,214; anchura bulbo esofágico: 0,016; diámetro máximo: 0,05; long. cola: 0,193; diámetro anal: 0,0273; (en mm).

Animales de pequeño tamaño, con cutícula estriada presentando anillos con puntua-

ciones y dibujos variados, que le da un aspecto heterogéneo. Los anillos anteriores presentan las terminaciones laterales en ala. Cabeza redondeada, con cuatro sedas cefálicas muy cortas (dos a tres μm). Cavidad bucal con diente dorsal hueco triangular y no muy grande; también presenta dos pequeños dientes ventrales. Ocelos difusos a un diámetro cefálico del extremo anterior. Bulbo faríngeo poco desarrollado. Esófago estrecho con bulbo terminal muy alargado y poco patente, posterior. Cola larga y cónica, que oscila entre tres y cinco diámetros anales en

machos y seis o siete en hembras. Machos con espículas estrechas y curvas de más de un diámetro anal, con gubernaculum recto (26 μm). Sin suplementos precloacales. Hembra con dos ovarios opuestos. Con respecto a la especie descrita por WIESER en 1954 vemos que en estos ejemplares la cola es algo más corta y en general son de mayor tamaño. Además Wieser no habla de la presencia de ocelos y aquí se han observado manchas pigmentarias oculares prácticamente en todos los ejemplares. Es la segunda vez que se halla esta especie, tras la cita original.



Neochromadora (N.) brevisetosa, extremo cefálico macho i. *N. (N.) b.*, macho