

*Neochromadora notocraspedota* n. sp. (Abb. 7)

Küste von Uruguay: 1 ♂.

L = 1,888 mm;  $\kappa$  = 18.51; B = 6.99;  $\gamma$  = 7.09.

Diese Art, von der ein einziges ♂ der Küste von Uruguay entstammt, unterscheidet sich von der Stammart, der aus der Barentssee beschriebenen *Neochromadora craspedota* (STEINER) 1916, hauptsächlich durch die dicke, grob geringelte Cuticula, die außerdem andersartig skulpturiert ist als bei der Vergleichsart, und zwar in den Seitenfeldern nicht wie bei der arktischen Art je eine Längsreihe kubischer Körperchen zeigt, sondern von ganz eigentümlich gestalteten, verhältnismäßig größeren, zusammenhängenden Körperchen gekennzeichnet wird.

Kopf papillös. Die geräumige, trichterförmige Mundhöhle ist mit einem mäßig großen, konischen, akuten, dorsalen Zahn bewaffnet.

Der Schwanz ist konisch verlängert und die Spicula sind kurz, nach hinten verjüngt, schwach gebogen.




Abb. 7. *Neochromadora notocraspedota*

n. sp.

a. Vorderende  $\times$  450, b. Schwanz  $\times$  250.