

#### 14. *Cyatholaimus elongatus* n. sp.

♂ ♀ 3,25. —  $\alpha$  chez le ♂ 45—50, chez la ♀ 45. —  $\beta = 8-8\frac{1}{2}$ . —  
 $\gamma$  chez le ♂ 12—16, chez la ♀ = 17.

Corps *très grêle*, peu rétréci en avant et en arrière: queue conique, courte, s'atténuant régulièrement. Cuticule annelée, les anneaux présentant des séries transversales et serrées de très petits points. Tête ressemblant à celle du *Cyath. caecus* (de Man, Mém. Soc. Zool. de France, 1889, Pl. VII, Fig. 10), mais les six papilles coniques sont beaucoup plus grandes. Une couronne de 10 soies céphaliques sveltes et assez longues. Cavité buccale armée d'une forte dent aiguë dans la ligne dorsale médiane; la paroi chitineuse de la division antérieure, située en avant de la dent, présente douze dilatations en dehors à la périphérie, comme chez le *Cyath. ocellatus* (de Man, l. c. Fig. 9b). Organes latéraux spiroïdes à quatre circonvolutions. *Pas de taches oculaires*. Spicules longs de 0,086 mm., arqués, de forme assez trapue. Pièce accessoire composée de deux pièces latérales, réunies par une pièce médiane; la pièce médiane manque chez le *Cyath. caecus*. Les pièces latérales sont environ aussi longues que les spicules, chacune porte *une seule petite dent aiguë* au bord médian mais l'extrémité inférieure dilatée des pièces latérales est couverte, au bord externe et au bord postérieur, d'un *très grand* nombre de pointes excessivement petites, qui manquent au *Cyath. caecus*. Comme chez cette espèce-ci le mâle présente cinq papilles tubiformes en avant de l'anus.

Ouverture génitale de la femelle au milieu du corps.

Habitat: Côtes de l'Escaut Oriental (Veere, Ierseke), assez rare.