

Es sind also beträchtliche Schwierigkeiten, mit denen eine Synopsis der bekannten Arten zu kämpfen hat, und es kann nicht Wunder nehmen, daß eine ganze Reihe als *Linhomoeus* oder *Paralinhomoeus* beschriebene Arten zu den unzureichend bekannten Formen gerechnet werden müssen: *Linhomoeus lineatus* DITLEVSEN 1919, *Linhomoeus viscosus* ALLGEN 1929, *Linhomoeus macquariensis* ALLGEN 1929, *Paralinhomoeus litoralis* ALLGEN 1932, *Linhomoeus paralineatus* ALLGEN 1933, *Paralinhomoeus strandibrevicaudatus* ALLGEN 1934, *Paralinhomoeus staurensis* ALLGEN 1940, *Paralinhomoeus amphilabiatus* SCHUURMANS STEKHOVEN 1942, *Paralinhomoeus brevicaudatus* SCHUURMANS STEKHOVEN 1950, *Paralinhomoeus ampullocaudatus* ALLGEN 1959, *Paralinhomoeus dolichurus* ALLGEN 1959, *Paralinhomoeus leptosoma* ALLGEN 1959 und *Paralinhomoeus pellucidus* ALLGEN 1959, ebenso auch *Crystallonema simile* COBB 1920.