

Pelagonema tenue Kreis (Abb. 2)

KREIS 1928, p. 161—162, pl. VIII, fig. 14b, pl. IX, fig. 14a—c.

ALGÉN 1947, p. 9—10, fig. 1a—c.

Fundort: Süd-Georgien. St. 22 d. Grytviken, Schlammprobe von Kelprhizoiden. 22. 5. 1902. 4 jugendl. Exemplare.

Größenangaben: ♀♀ L = 1,646—2,480 mm; α = 41,1—56,5; β = 4,2—5,4; γ = 34,6—52,5; V = 58,6—65,3%.

Körper schlank, beidseitig verjüngt. Kopf abgerundet, mit 6 Lippen und kleinen Papillen sowie mit 2 lateralen und 8 sub-




Abb. 2. *Pelagonema tenue* Kreis

a) Totalbild (aus Allgén 1947, b) Vorderende und c) Schwanz (aus Kreis 1928).

medianen Borsten versehen, die $\frac{1}{6}$ des fraglichen Kopfdurchschnitts messen. Seitenorgane in der Höhe des Vorderteils der Mundhöhle gelegen, rund, klein, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{9}$ der Kopfbreite messend.

Mundhöhle von stark verdickten Wänden begrenzt, in ihrer Gestalt der des *P. obtusicaudum* ähnlich, aber schmaler als bei dieser Art.

Oesophagus zylindrisch. Die weit vorne, und zwar 2,33 Kopfbreiten vom Vorderrand, d. h. vor dem Nervenring gelegene Ventraldrüse mündet gleich hinter den Kopfborsten aus.

Der Schwanz ist dem von *P. obtusicaudum* ähnlich, aber schlanker, kurz, konisch und mißt zweimal den analen Körperdurchmesser.

Vulva hinter der Körpermitte gelegen. Weibliche Organe paarig aber unsymmetrisch, indem von den nicht umgeschlagenen Ovarien das vordere Ovarium im allgemeinen kürzer bleibt als das hintere.

Weitere geographische Verbreitung. Arktis: Spitzbergen-Archipel (KREIS 1928), Schweden: Südlicher Kattegatt (ALLGÉN 1947).