

Quadricoma pontica n. sp. (табл. 3, рис 25 а—с).

$$\text{♂} \quad \frac{3,0 \quad 17 \quad - \quad 82}{3,7 \quad 12,5 \quad 14 \quad 10,2} \quad 430$$

$$\alpha=7; \beta=6^{1/2}; \gamma=5^{1/2}.$$

Le corps reste de grandeur à peu près égale de l'ocelle presque jusqu'à l'anus et s'amincit assez brusquement aux extrémités.




Les anneaux secrétés de la cuticule au nombre de 43 occupent aux extrémités presque toute la surface du corps, tandis qu'au milieu ils laissent une distance assez grande entre eux. La largeur des anneaux varie un peu, en restant à peu près 10—12 μ . La hauteur des anneaux est de 8 μ , l'épaisseur de la cuticule sans anneaux 4 μ . Les sètes sont longues de 11 μ sur tout le corps, variant très peu autour de cette longueur. Elles sont disposés comme suit:

4 dv, 8 v, 10 d, 11 v, 14 v, 16 d, 18 v, 20 d, 21 v, 26 dv, 30 v, 32 d, 34 v, 37/38 d, 38 v.

La tête est plus allongée que chez l'espèce précédente, 14 μ de longueur, 16 μ de largeur. Les sètes céphaliques assez robustes, longues de 11 μ étaient courbés en arrière ce qui est peut être caractéristique à l'espèce. L'ocelle est disposé au niveau du 9me anneau.

Les spicules sont longues de 40 μ , elles sont courtes, presque pas céphalées, aiguës à l'extrémité distale. Le gubernacle est disposé du côté dorsale des spicules, il est composé d'une petite pièce chitineuse courbée en angle obtus, sa longueur est 20 μ .

La queue est composée de 8 anneaux, l'anus passant entre le 35 et 36 me anneau. L'anneau dernier est long de 16, large de 9 μ , le tube terminal est assez fort, long de 9 μ , large de 4 μ . Proportions: longueur de la queue 1,8; longueur de l'anneau terminal 0,4, sa largeur 0,2; longueur du tube terminal 0,2, sa largeur 0,1; spicules 0,9; gubernacle 0,45.



25a. *Q. pontica* n. sp. L 7—0.

25b. ——— Голова самца.—Tête du mâle. L $\frac{1}{16}$ —3.

25c. ——— Хвост самца.—Queue du mâle. L 7—3.