

Herrn Professr L. Hel

hochachtensvollst

v. J. Sinzow.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о новыхъ и мало-изслѣдованныхъ формахъ раковинъ изъ третичныхъ образованій Новороссіи.

И. СИНЦОВА.

Въ третьемъ выпускѣ изслѣдованія моего о новыхъ и малоизвѣстныхъ формахъ третичныхъ раковинъ будутъ описаны слѣдующіе виды:

а) Изъ песчаныхъ пластовъ Куюльницкаго лимана.

*Paludina (Vivipara) subconcinna n. sp.*, которая по рисункамъ Гёрнса принята была мною въ началѣ за *Paludina concinna*. Сравненiemъ ея съ вѣскими образцами послѣдняго вида показали, что рассматриваемая нами форма замѣтно уклоняется отъ *P. concinna Hörn.* (*P. Fuchsii Neum.*) и ближе стоитъ къ *P. Sadleri Partsch.*

*Cardium vulgare n. sp.*, по видѣнію виду своему сходный съ молодыми экземплярами *C. semisulcatum*, *C. pseudocatillus* и иѣкоторыми другими формами. Онъ болѣе выпуклъ и закругленъ, чѣмъ *C. pseudocatillus*; но болѣе плоскій, чѣмъ *C. semisulcatum*, и кромѣ того снабженъ большимъ количествомъ слабо выдающихся реберъ. Замочный аппаратъ состоять изъ срединныхъ, сильно развитыхъ и двухъ боковыхъ удлиненно-пластинчатыхъ зубцовъ.

б) Изъ пластовъ конгера.

*Dreissena novorossica n. sp.*, въ огромномъ количествѣ встрѣчающаяся въ рыхлыхъ пескахъ Таракліи и въ одесскомъ известнякѣ, но впервые форма эта найдена была мною въ голубовато-сѣрой глине Одессы. По величинѣ своей *Dr. novorossica* сходна съ формой, описанной Н. П. Барботомъ-де-Марни подъ названіемъ *Congeria simplex*, но отличается отъ нея тупыми, закругленными носиками и сильно развитыми слѣдами прикрепленія ножныхъ мускуловъ. Это, такъ сказать, *Dreissena aperta* Desh., но отличающаяся своею незначительною величиною.

*Cyrena Widhalmi n. sp.* Весьма небольшая и сплюснутая форма, довольно часто встречающаяся въ одесскомъ известнякѣ, въ каменоломняхъ, расположенныхъ близъ института и около Нов. Слободки.

*Pupa substridens n. sp.*, которую я вначалѣ былъ склоненъ рассматривать только разновидностью *P. tridens*.

*Valvata biformis n. sp.* Видъ этотъ обыкновенно смѣшиваются съ *Valvata piscinalis* M ll.; но внимательное изслѣдованіе показало, что большое количество экземпляровъ нашего вида снабжено хорошо развитымъ килемъ, проходящимъ въ верхней части оборотовъ раковины. Есть не мало и такихъ образцовъ, которые совершенно гладки. *Valvata biformis* весьма интересна въ томъ отношеніи, что она составляетъ переходъ отъ *Valvata* собственно къ подроду *Tropidina*. *Valvata Sibinensis* Neum., по видимому относится къ нашему же виду, но представляетъ молодой экземпляръ.

*Lithoglyphus Neumayri n. sp.*, не рѣдко встречающейся (вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ) въ глубовато-темныхъ глинахъ Одессы. Видъ этотъ по вицѣнному очертанію своему ближе всего походитъ на *L. fuseus*, но главнымъ образомъ отличается отъ него меньшимъ утолщеніемъ внутренняго края отверстія.

с) Изъ формациі мактроваго известняка.

*Cardium Döningii n. sp.*, по виѣшнему виду своему и по характеру реберъ отчасти напоминающій *Cardium planum Desh.*, но отличающійся отъ послѣдняго вида относительно большею шириной и чрезвычайно слабо развитыми замочными зубцами, подобно тому, какъ это наблюдается у *C. parvula aviculare*.

*Donax Hörnesi n. sp.* Форма, эта, изрѣдка встрѣчающаяся въ фораминиферовомъ известнякѣ Кишинева, опредѣлена была вначалѣ мною (и другими изслѣдователями) какъ *Donax lucida Eichw.* Въ настоящее время я имѣю хороши образцы этого вида, которые отличаются отъ *D. lucida* относительно большей длиною и имѣютъ теллинообразный *habitus*.

*Phasianella Neumayri n. sp.* по скульптурѣ своей сходная съ *Ph. striato-tuberculata*, но отличающаяся отъ послѣдняго вида значительно меньшою шириной. По виѣшней формѣ *Phas. Neumayri* имѣеть такое же отношеніе къ *Rh. Striato-tuberculata*, какое имѣеть *Ph. elongatissima* къ *Ph. bessarabica*.

*Phasianella intermedia n. sp.* составляетъ какъ-бы переходъ отъ *Ph. bessarabica* къ *Ph. Striato-tuberculata*. Обороты ея гладки (какъ у *Ph. bessarabica*), но снабжены хорошо развитымъ килемъ.

*Odostomia bessarabica n. sp.*, отличается отъ *Odostomia (Melania) Fuchsii R. Hörn.*, хорошо развитымъ килемъ, проходящемъ по срединѣ каждого оборота.

Одесса.

15 Февраля, 1876 года.