



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk = Bulletin de
l'Académie des sciences de Russie**

Petrograd :Akademiiia,1920-1925.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/79291>

ser.6:t.14:no.1-18 (1920):

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/151348>

Page(s): Title Page, Page 60, Page 61

Holding Institution: Smithsonian Libraries

Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 5 November 2021 3:11 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1390714i00151348.pdf>

This page intentionally left blank.

Q
60
198
NH
Izvestiia
ИЗВЕСТИЯ

Rossiiskoi akademii nauk
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

VI СЕРИЯ.

ТОМ XIV. 1920.

BULLETIN

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE RUSSIE.

VI SÉRIE.


TOME XIV. 1920.

ПЕТРОГРАД. — PETROGRAD.

ХІ заседание, 22 сентября 1920 года.

Академик А. Н. Крылов доложил Отделению для напечатания в «Приложении» к протоколу свою статью «О применении метода численного интегрирования уравнений к вычислению траектории снаряда» (Sur l'application de la méthode de l'intégration numérique des équations au calcul du trajectoire des projectiles).

Положено напечатать в «Приложении» к протоколу.

ХІІ заседание, 6 октября 1920 года.

Главная Российская Астрономическая Обсерватория, отношением от 22 сентября за № 976, сообщила, что в заседании Совета астрономов 10 сентября сего года профессор К. Д. Покровский единогласно избран на должность старшего астронома Обсерватории, и просит Академию, согласно временным правилам по управлению Обсерваторией, утвердить К. Д. Покровского в означенной должности.

Положено утвердить, о чем и сообщить Обсерватории.

ХІІІ заседание, 20 октября 1920 года.

Академик А. А. Белопольский представил Отделению для напечатания в «Известиях» Академии свою статью «Сравнение спектров новых звезд 1892, 1901, 1912, 1918 и 1920 гг.» (Comparaison des spectres des nouvelles de 1892, 1901, 1912, 1918 et 1920).

Положено напечатать в «Известиях».

Непременный Секретарь доложил, что проф. Д. А. Золотарев доставил из Саратова составленную ассистентом ИФ Факультета Саратовского Университета Б. Зайковским справку о находках костей мамонта, разумея под этим ископаемых слонов вообще.

Положено благодарить проф. Д. А. Золотарева, передать справку в Зоологический Музей, а копию в Геологический и Минералогический Музей.

Академик Н. В. Насонов читал:

«Имею честь сделать следующее предварительное сообщение по фауне *Turbellaria* Петроградской губернии:

«В настоящее время мною обнаружена весьма богатая и довольно оригинальная фауна *Turbellaria* пресных вод различных местностей Петроградской губ. В ней

можно было констатировать нахождение более 50 форм *Rhabdocoelida* и 5 видов *Tricladida*. Здесь между прочим найдено мною *Microstomum canum* (Fuhm.) встречаемый до сих пор в Швейцарии и Франции, *Provortex stagnorum* Seveга, найденный лишь в Богемии, *Opisthomum dimitrii* Nason., описанный мной для Вятской губ., *Dalyellia sibirica* (Plotn.) известная лишь для Сибири и *Dalyellia chlynovica* Nason., образующая здесь особый подвид *Subsp. occidentalis* n. subsp., отличающийся утолщением проксимального края основной пластинки и с дистальным краем ее в виде сплетения нескольких хитинных нитей. Кроме того мною найдены новые виды: *Olistanella opistomiformis* n. sp., имеющий лиловато-синие глазки, соединенные друг с другом перемычкой с утолщением посредине и снабженные хрусталиком; найден в прудах около Лигова. *Stenostomum peterhofi* n. sp., отличающийся тем, что не имеет светопреломляющих органов чувств и глотка дифференцирована на передний мускулистый и задний железистый отдел, за которым следует довольно длинный и широкий пищевод с прозрачными стенками, найден близ биологической станции в Старом Петергофе. *Dalyellia mollosovi* n. sp., принадлежащий к группе *D. armiger* (O. Schm.), характеризуется сильной асимметрией основной пластинки хитинного полового вооружения с зачаточным проксимальным отростком (стебельком) с одной стороны, с пятью изогнутыми шипами с той же стороны и с одним или двумя шипами с другой; шипоносная ветвь одна и притом в зачаточном состоянии; найден ранней весной в лесной пересыхающей луже с дном, поросшим мхом, в Лужском уезде. *Dalyellia oligochaeta* n. sp. близкая к саратовской *Dalyellia synchaeta* Nason., в особенности же к вятской *Dalyellia polychaeta* Nason.; весьма сходна также с *Dalyellia fairchildi* Graff. из Северной Америки; отличается тем, что одна шипоносная ветвь короче другой; шипы на ветвях сидят в два ряда; шипы от основной пластинки отходят в числе семи; найден в прудах Александра за Нарвской Заставой.

«Все эти новые формы вместе с *Dalyellia sergia* и *Phoenocara cuscumerina*, найденными Вл. Беклемишевым, отличают фауну Петроградской губ. и прилегающих к ней местностей, но в то же время состав ее очень схож с составом фауны *Turbellaria* изученных местностей вообще озерной области на северо-западе России. Кроме того, присутствие ряда форм в рассматриваемой фауне говорит за влияние на нее фауны, населяющей южный берег Балтийского моря от Дании до Лифляндии».

Положено принять к сведению.