


Oncholaimus Dujardinii n. sp.

Pl. VII, fig. 4, a—c.

Espèce très-voisine de l'*Onchol. attenuatus* Duj., qui habite le littoral occidental de la France. L'une et l'autre ont le facies extérieur et la grandeur égales; notre espèce atteint une longueur de 2,6 millimètres et a le corps à-peu-près cinquante fois plus long que large. Six petites soies très-courtes à la tête, la cavité buccale allongée; au fond de cette dernière se trouvent deux taches *d'un noir foncé*, qui sont rouges chez l'espèce nommée de la Bretagne. L'ouverture du tube excréteur se trouve, relativement à la longueur du pharynx, *beaucoup plus* éloignée du bord antérieur de la tête, que chez l'autre espèce. Peut-être, que la forme de la queue, que l'on peut reconnaître plus facilement par la figure ci-jointe que par une description, est caractéristique pour l'espèce Napolitaine: immédiatement devant l'anus on voit à chaque côté deux soies courtes et roides, très-près les unes des autres; un peu plus en avant une papille médiane (a), tandis que sur le corps entier s'observent des soies courtes et rares; à la partie caudale du corps on voit près de l'anus quelques (3) petites soies courtes à chaque côté, encore quelques-unes plus en arrière, enfin à l'extrémité de la queue à chaque côté une petite soie.

Dimensions en micromillimètres:

	♂
Longueur totale du corps	2588
Longueur du pharynx.	27
Longueur de l'oesophage	392
Distance depuis le commencement de l'intestin jusqu'à l'anus.	2157
Distance de l'ouverture du tube excréteur jusqu'au bout antérieur du corps	74
Longueur de la queue	39
Diamètre transversal à la hauteur de l'extrémité de l'oesophage.	47
Diamètre transversal au milieu du corps.	51



Oncholaimus Dujardinii de M. *b.* le côté médian de la tête.